Espeiação de metais em sedimentos da Lagoa de Araruama, Rio de Janeiro

Stener Romanel Ambrozio, Gabriel R. Pugliese Andrade

A Lagoa de Araruama, está localizada na região dos lagos no litoral do Rio de Janeiro. É a maior lagoa costeira hipersalina do Brasil, caracterizada pela sedimentação carbonática e com área de 210 km². A baixa renovação de suas águas faz com que os sais se concentrem na lagoa e a caracterizem como hipersalina (salinidade média de 52‰). A concentração dos sais e elementos presentes na lagoa, aliada à pouca disponibilidade de oxigênio abaixo da coluna d'água, condiciona o sedimento a processos químicos específicos. Quando condições redutoras são favoráveis, sulfatos podem ser reduzidos a sulfetos e reagir com Fe⁺² (dissolvido devido às condições redutoras), formando principalmente pirita. Sendo assim, a pirita pode ser utilizada como um indicador de condições redutoras de ambientes como manguezais, marismas e lagoas costeiras com características similares, através da concentração de ferro (DOP) e demais metais (DTMP) associados ao mineral. Além disso, a concentração dos metais nas diferentes frações mineralógicas pode indicar maior ou menor mobilidade e consequente disponibilidade no ambiente. A investigação objetiva determinar a concentração de metais no sedimento da Lagoa e como estão associados aos minerais presentes. Para tanto caracterizou-se a assembleia mineralógica por difração de raios-X (DRX), como etapa inicial. Amostras de sedimento da Lagoa de Araruama foram coletadas em setembro de 2021 com auxílio de um busca-fundo. As amostras de sedimento foram secas em temperatura ambiente, trituradas com auxílio de um almofariz e peneiradas em granulometria de 0,002 a 0,02 mm (silte). A análise de DRX foi efetuada em um equipamento Rigaku Miniflex II. Os resultados dos difratogramas mostram a presença de halita, calcita, óxidos de Fe, caulinita, quartzo, pirita, gipsita e ilita (em apenas uma amostra). Estes resultados mostram-se de acordo com o esperado para o ambiente em estudo. Minerais como calcita e halita têm sua presença justificada pela elevada presença de carbonatos (provenientes de conchas e da sedimentação química) e cloreto de sódio (no caso da halita). A caulinita indica a presença de sedimentos intemperizados, derivados das áreas continentais adjacentes. Também se observou a presença considerável de quartzo, mineral sempre associado a sedimentos marinhos. A presença de pirita confirma as condições redutoras, que possibilitam a formação do mineral. A ilita foi observada somente em uma amostra de sedimento situada próximo a um valão que deságua na Lagoa. Sua presença neste ponto possivelmente tem relação com este aporte de sedimentos. Os resultados preliminares corroboram com esperado para as características geoquímicas do ambiente.

*Instituição do Programa de PG: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Fomento da bolsa : Capes*