Análise da sensibilidade da extração de RNA embrionário associada a RT-PCR para detecção de transcritos derivados de blastocistos bovinos após diluições seriadas do cDNA

Vanessa Lamim Lovatel¹, Márcia Sabino², Paula Magnelli Mangiavacchi³, Álvaro Fabrício Lopes Rios³, Luis Fonseca Matos¹

RESUMO

A análise da expressão gênica de embriões bovinos produzidos pelas técnicas de superovulação e produção in vitro é de grande importância para a identificação das possíveis alterações provocadas pelos protocolos de reprodução assistida. O presente trabalho foi realizado com o objetivo de analisar a sensibilidade de detecção de transcritos de embriões bovinos produzidos in vitro através da utilização do kit ZR RNA Microprep associado a RT-PCR em diluições seriadas de cDNA. Embriões bovinos foram produzidos in vitro a partir de ovócitos aspirados de ovários de matadouro e fertilizados com sêmen de um mesmo touro. Embriões em estádios de desenvolvimento de blastocisto e blastocisto eclodido foram selecionados e armazenados em meio RNA-later®. O RNA total de amostras contendo 1 blastocisto (contendo cerca de 80 células) e 5 blastocistos eclodidos (cerca de 260 células cada embrião) foi extraído através da utilização do ZR RNA Microprep (ZYMO Research). Cada amostra foi submetida à digestão com 1U de Dnase I (Ambion) para eliminar possíveis contaminações com DNA genômico. Com o RNA obtido foi realizada a transcrição reversa utilizando o kit High Capacity cDNA Reverse Transcription kit (Applied Biosystems). A detecção dos transcritos foi realizada através de PCR utilizando os primers para o gene da β -actina bovina. As amostras de cDNA de cada RT foram diluídas 1: 10, 1:100 e 1:1000 vezes e subsequentemente utilizadas para realização da PCR. Os resultados obtidos demonstram que o protocolo utilizado conseguiu detectar a presença de transcritos do gene da β -actina bovina de cDNA de blastocistos eclodidos nas diluições 1:10 (± 130 células); 1:100 (± 13 células) e 1:1000 (± 1.3 células). A amplificação do cDNA derivado de um blastocisto único detectou a presença de transcrito nas diluições 1:10 (± 8 células) e 1:100 ($\pm 0,8$ células), mas não na diluição de 1:1000. Esses resultados demonstram uma elevada sensibilidade de recuperação de transcritos do kit ZR RNA Microprep (ZYMO) e sua eficiência na produção de cDNA quando associado a RT-PCR. Os protocolos utilizados nesse es-

IV Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica

17º Encontro de IC da UENF
9º Circuito de IC da IFF
5ª Jornada de IC da UFF

Medicina Veterinária

Ciência e Tecnologia no caminho da Cooperação Internacional

tudo poderão ser utilizados para análise de expressão de embriões, amostras de biópsias embrionárias com pouco número de células, e até mesmo blastômeros isolados.

PALAVRAS CHAVE: Blastocistos bovinos, Produção in vitro, RNA embrionário

APOIO FINANCEIRO: FAPERJ, CNPq

IV Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica

17º Encontro de IC da UENF
9º Circuito de IC da IFF
5ª Jornada de IC da UFF

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Medicina Veterinária