Estudos petrofísicos das formações Irati e Botucatu da Bacia do Paraná

Marina de Sousa Rangel e Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla

RESUMO

Esse trabalho apresenta um estudo dos aspectos petrofísicos de amostras de rochas analisadas por espectrofotômetro de raios X, para fazer uma análise composicional, quanto à identificação e quantificação dos elementos químicos presentes. As amostras analisadas correspondem às rochas das Formações Botucatu e Irati presentes da Bacia do Paraná. Os resultados obtidos mostram que a amostra da Formação Botucatu é formada na sua maioria por silício e alumínio, o que indica que a rocha é do tipo sedimentar e não vulcânica. A Bacia do Paraná é uma ampla bacia sedimentar situada na porção centro-leste da América do Sul, principalmente no Brasil. Sua ocorrência abrange o nordeste da Argentina, centro-sul do Brasil (desde o MT até RS), além da porção leste do Paraguai até o Uruguai. É uma depressão ovalada sendo sua área cerca de 1,5 milhões de Km. Seu registro sedimentar compreende rochas formadas num intervalo de tempo entre 460 a 65 milhões de anos. Sua espessura máxima é de mais 7.000 m e é constituída por rochas sedimentares e ígneas. A Formação geológica Botucatu é composta por arenitos médios a grossos, às vezes conglomeráticos, quartzosos, amarelos ou vermelhos, com estratificações cruzadas acanalada e tabulares de pequeno porte e bolas de argila nas superfícies de reativação, além de raros pacotes rítmicos de siltitos argilosos vermelhos. A Formação Irati, por outro lado, é constituída por argilitos e folhelhos intercalados, de cores cinza-escuro a negro. A laminação dos folhelhos é plano-paralela e rítmicas seções em que se intercalam folhelhos e calcários. O método utilizado para a realização do experimento foi a espectrometria a partir do aparelho utilizado no laboratório de petrofísica da UENF/LENEP, o espectrofotômetro que trabalha com a base física do Efeito Compton. A primeira parte do projeto nessa nova fase foi à análise dos componentes químicos da Formação Botucatu. Obtivemos o resultado de quatro componentes químicos e suas quantidades: 0.39% óxido de magnésio (MgO), 5.04% óxido de alumínio (Al₂O₃), 93.90% óxido férrico (Fe₂O₃) e 0.43% dióxido de silício (SiO₂); mostrados no aparelho a partir de um gráfico de pressão (106 atmosfera) versus energia (eletrovolts). A partir dos resultados encontrados no teste feito, pode-se dizer que a amostra de rocha analisada é do tipo SIAL, quer dizer, é formada na sua maioria por silício e alumínio. Esse fato nos diz que a rocha da Formação Botucatu é do tipo sedimentar e não do tipo vulcânica.

PALAVRAS CHAVE: Petrofísica, Geofísica, Engenharia.

**IV Congresso
Fluminense
de Iniciação
Científica
e Tecnológica**

17º Encontro de IC da UENF
9º Circuito de IC da IFF
5ª Jornada de IC da UFF

Solos